



## SPRÁVNÁ APLIKAČNÍ TECHNIKA DO BÁZE UŠNÍHO BOLTCE SKOTU PŘI POUŽITÍ ANTIBIOTIKA NAXCEL CATTLE

Dobrá fixace hlavy je základem pro správnou aplikaci antibiotika. Dle dostupné technologie využijte krční fixační zábranu, žlabovou zábranu, nebo fixační klec. Cílem je dosáhnout pozice hlavy, kdy máme volně dostupné jedno ucho.



Očistěte bázi ucha. Pokud je silně znečištěná, omyjte vodou. Před vlastní aplikací místo dezinfikujte tamponem s dezinfekčním roztokem.

Identifikujte trojúhelníkovou oblast pro aplikaci na zadní straně ucha, která je v místech, kde ucho přisedá k hlavě. Nahmatějte polokruhovou chrupavku a pružný polštářek tkáně pro aplikaci.





**Uchopte stříkačku s jehlou a nasměrujte hrot jehly pro vpich tak, aby sledoval pomyslnou linií, procházející napříč hlavou k protějšímu oku zvířete.**



**Mírným tlakem aplikujte celý obsah injekční stříkačky.**



**Pro aplikaci doporučujeme používat jehlu 16 x 25 mm.**



## **Léčba jednou dávkou !**

**Jedna injekce a práce je hotova. To je důvod, proč si tento systém terapie pochvalují veterináři v chovatelsky vyspělých zemích. Alespoň to ukázal průzkum, který byl naší společností uskutečněn<sup>1</sup>. Koncept terapie přispívá k dalším dvěma důležitým atributům léčby:**

- 1) Dodržení dávky antibiotika po nutnou dobu.**
- 2) Přispívá k welfare a zbytečnému „obtěžování“ zvířat.**

**Výše uvedený průzkum také ukázal, že zprvu obávaná technika aplikace si bezproblémově našla místo na farmách skotu.**

<sup>1</sup> Pfizer Animal Health (2010). Vets interviewed by independent contractor. Participating vets' identities available on request. Data on file