


Obecné zásady míchání Formasilu

- **Používej vždy čistou vodu** – ideálně pitnou nebo kvalitní užitkovou bez chlóru. Nechte vodu “odrazit”, aby dosáhla $<14\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Po rozmíchání **použij do 48 hodin** – bakterie jsou živé a časem ztrácí účinnost.
- Chraň roztok před **přímým sluncem** a teplem nad $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Dodržuj doporučené dávkování podle druhu inokulantu.

Varianta 1: Velkoobjemový aplikátor (50–200 litrů)

Postup rozmíchání:

1. **Příprav čistou nádrž** (50–200 l).
2. Vezměte ideálně shaker a nalijte do **něho 1,5 litru** odstáté vody.
3. Nasyp celé balení Formasilu (např. 100 g sáček).
4. Důkladně promíchejte.
5. Směs nalijte do hlavní nádrže aplikátoru a doplň na požadovaný objem (např. 100 l).
6. **Dávkování:** běžně **2–3 litry roztoku na tunu hmoty** (dle instrukcí na etiketě)



● Varianta 2: Mikro-aplikátor (LDS – Low Dosing System)

Postup rozmíchání:

1. Připrav čistou nádobku (např. 5 - 15 l nádrž).
2. Vezměte ideálně shaker a nalijte do **něho 1,5 litru** odstáté vody.
3. Nasyp celé balení Formasilu (např. 100 g sáček).
4. Důkladně promíchejte.
5. Nalijte směs do mikro-aplikátoru.
6. **Dávkování:** LDS aplikuje běžně **0,8–20 ml roztoku za minutu**. Případně využijte [tuto tabulku](#) na lepší pochopení.



